



DeltaSTOP

pułapki feromonowe
do sygnalizacji
występowania szkodników

✓ Zastosowanie:

- ✓ w celu identyfikacji i stwierdzenia obecności szkodników w uprawie,
- ✓ w celu oszacowania liczebności szkodliwego gatunku,
- ✓ w celu wyznaczenia maksimum lotu, ustalenia potrzeby i terminu zabiegu ochronnego przeciwko szkodnikom

Feromony są przenoszone wraz z ruchami powietrza i działają na duże odległości, od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Samce są zwabiane do pułapki przez feromon płciowy samic tego samego gatunku. Feromon znajduje się w dyspenserze, który jest podstawowym elementem pułapki.

Zastosowanie pułapki feromonowej pozwala na wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu insektycydem, co pozwala na uzyskanie jego najlepszej efektywności.



podłoga lepowa z pułapki



BIOCONT

www.biocont.pl
biocont@biocont.pl
www.facebook.com/biocontpolska/



DeltaSTOP - pułapki feromonowe

Feromony są przenoszone wraz z ruchami powietrza i działają na duże odległości, od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Samce są zwabiane do pułapki przez feromon płciowy samic tego samego gatunku. Feromon znajduje się w dyspenserze, który jest podstawowym elementem pułapki.

Sposób stosowania: pułapki feromonowe należy umieścić tydzień przed spodziewanym lotem dorosłych osobników szkodliwych gatunków owadów, pułapki kontrolować 2-3 razy w tygodniu.

Liczba pułapek: Równomiernie rozmieszczone min. 3 sztuki, oddalone o co najmniej 50 m od siebie.

Zestaw zawiera: 1 pułapkę, 1, 2 lub 3 dyspensery feromonowe (zależnie od liczby pokoleń szkodnika), 4 lub 6 lepowych podłóg.

Okres trwałości: Dyspensery feromonowe przechowywać w temperaturze od -5 do +5°C, do 12 miesięcy.

Pozostałe elementy pułapki, dopóki nie zostaną uszkodzone.



pułapka w uprawie szklarniowej



pułapka w sadzie jabłoniowym

W ofercie:

Owocówka jabłkóweczka (*Cydia pomonella*) - jabłoń

Owocówka śliwkóweczka (*Grapholita funebrana*) - śliwa i inne

Płatkówka pstrocineczka (*Hedya nubiferana*) - jabłoń, inne drzewa i krzewy owocowe

Wydłubka oczateczka (*Spilonota ocellana*) - jabłoń, inne drzewa i krzewy owocowe

Zwójka siatkóweczka (*Adoxophyes orana*) - jabłoń, inne drzewa i krzewy owocowe

Zwójka bukóweczka (*Pandemis heparana*) - jabłoń, inne drzewa i krzewy owocowe

Zwójka południóweczka (*Grapholita molesta*) - morela, brzoskwinia, jabłoń

Owocówka głógóweczka (*Grapholita janthinana*) - jabłoń

Zwójka kwasigronóweczka (*Eupoecilia ambiguella*) - winorośl

Zwójka krzyżóweczka (*Lobesia botrana*) - winorośl

Kistnik malinowiec (*Byturus tomentosus*) - malina

Pryszczarek namalinek łodygowy (*Resseliella theobaldi*) - malina

Skośnik pomidorowy (*Tuta absoluta*) - pomidory pod osłonami

Zachodnia stonka kukurydziana (*Diabrotica virgifera*) - kukurydza

i inne



BIOCONT

dr Michał Pniak
+48 662 043 388
m.pniak@biocont.pl

Mariusz Staszczuk
+48 570 056 123
m.staszczuk@biocont.pl
Centralna Polska

Piotr Zieliński
+48 795 185 177
p.zielinski@biocont.pl
Mazowsze

Sławomir Dułacz
+48 795 185 176
s.dulacz@biocont.pl
Zachodnia Polska

Krzysztof Jędrzejowski
+48 570 809 123
k.jedrzejowski@biocont.pl
Wschodnia Polska