



RIZOCORE[®]

mikrobiologiczny, doglebowy
preparat pomocniczy

Zawiera: mikoryza 5%, *Bacillus megaterium* 10⁴ JTK/g, *Trichoderma harzianum* (szczep INAT11) 11¹⁰ JTK/g

- ✓ konkuruje z patogenami o miejsce i składniki odżywcze, ograniczając im możliwość rozwoju
- ✓ wspomaga rozwój systemu korzeniowego
- ✓ poprawia wzrost i rozwój roślin
- ✓ indukuje odporność roślin
- ✓ ułatwia roślinom przyswajanie składników pokarmowych

Zastosowanie:

- zaprawa nasienna
- zaprawianie korzeni
- zraszanie lub podlewanie powierzchni gleby
- wtrysk do systemów hydroponicznych
- oprysk gleby i nadziemnych części roślin

Redukuje negatywny wpływ czynników stresowych pochodzenia glebowego. Mikroorganizmy zawarte w preparacie wytwarzają związki, które przekształcają substancje odżywcze znajdujące się w glebie w formy lepiej dostępne dla roślin.



BIOCONT

www.biocont.pl
biocont@biocont.pl
www.facebook.com/biocontpolska/



RIZOCORE®

Zawiera: mikoryza 5%, *Bacillus megaterium* 10⁴ JTK/g, *Trichoderma harzianum* (szczep INAT11) 11¹⁰ JTK/g

Mikroorganizmy zawarte w preparacie rozwijają się intensywnie wokół systemu korzeniowego co uniemożliwia rozwój niektórych patogenów, np. *Pythium*, *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Sclerotinia*, *Cylindrocladium*. Preparat nadaje się do zaprawy młodych sadzonek i nasion.

UWAGI! Preparatu nie należy mieszać z doglebowymi środkami grzybobójczymi. Po dezynfekcji gleby zabieg można przeprowadzić najwcześniej po 2 tygodniach.

* pierwsza aplikacja przed siewem, bezpośrednio z nawadnianiem do gleby lub jako zaprawa

** obie aplikacje z nawadnianiem



Korzenie sadzonki bratka po zastosowaniu RIZOCORE w porównaniu z nietraktowaną sadzonką

uprawa	dawka	sposób zastosowania
nasiona	50-80 g/ha* 50 g/ha	zabieg przed siewem zaprawa nasion
warzywa w gruncie	40-60 g/ha*	2 zabiegi w odstępie 4-6 tygodni
warzywa pod osłonami	60-80 g/ha*	2 zabiegi w odstępie 4-6 tygodni
sady	40-80 g/ha**	2 zabiegi w odstępie 4-6 tygodni
zaprawa nasion i siewek	60-80 g/ha	zaprawa nasion, zanurzanie sadzonek
rośliny ozdobne	40-60 g/ha*	2 zabiegi w odstępie 4-6 tygodni

źródło: prof. Causin - Padova University



Fusarium graminearum
+ *Trichoderma*



Fusarium graminearum
(fuzarioza zbóż)

Mikroorganizmy zawarte w preparacie rozwijają się intensywnie w strefie korzeniowej, nie rozstawiając miejsca na rozwój patogenów.

Mniejsza presja patogenów, przekłada się na zmniejszenie stresu roślin i lepsze plonowanie.

Opakowanie: 50 g

Przechowywanie: 9 miesięcy w temperaturze 20°C, 1 rok w temperaturze 4°C



BIOCONT

dr Michał Pniak
+48 662 043 388
m.pniak@biocont.pl

Mariusz Słazczyk
+48 570 056 123
m.słazczyk@biocont.pl
Centralna Polska

Piotr Zieliński
+48 795 185 177
p.zielinski@biocont.pl
Mazowsze

Sławomir Dułacz
+48 795 185 176
s.dulacz@biocont.pl
Zachodnia Polska

Krzysztof Jędrzejowski
+48 570 809 123
k.jedrzejowski@biocont.pl
Wschodnia Polska